Existence d'une unique distribution invariante qui n'entraîne pas nécessairement la convergence des distributions.

Soit le graphe suivant :

Il n'y a convergence que si l'état initial est $\pi_0 = \left(\frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3}\right)$

Démonstration :

La matrice de transition du graphe probabiliste ci-dessus est : $T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

- Montrons qu'il existe une unique distribution invariante :

Ceci revient à déterminer la matrice ligne $\pi = (a \quad b \quad c)$ telle que $\pi T = \pi$

$$\pi T = \pi \Leftrightarrow (a \quad b \quad c) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (a \quad b \quad c) \Leftrightarrow (c \quad a \quad b) = (a \quad b \quad c) \Leftrightarrow \begin{cases} c = a \\ a = b \\ b = c \end{cases} \Leftrightarrow a = b = c$$

$$\text{De plus, } a + b + c = 1 \text{ donc } \begin{cases} \pi T = \pi \\ a + b + c = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \pi = \left(\frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3}\right)$$

Ce graphe probabiliste donne une unique distribution invariante : $\pi = \left(\frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3}\right)$

- Déterminons π_n , suivant les valeurs de $n \in \mathbb{N}$, avec π_0 la distribution initiale.

$$\text{On remarque que } T^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } T^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

(ce qui se conçoit vu le graphe...)

Une récurrence immédiate permet d'en déduire que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, T^{3k} = I, T^{3k+1} = T \text{ et } T^{3k+2} = T^2$$

Et donc : $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{cases} \pi_{3k} = \pi_0 T^{3k} = \pi_0 I = \pi_0 \\ \pi_{3k+1} = \pi_0 T^{3k+1} = \pi_0 T \\ \pi_{3k+2} = \pi_0 T^{3k+2} = \pi_0 T^2 \end{cases}$$

• Conclusion :

d'après les deux points précédents : $\forall k \in \mathbb{N}$, $\pi_{3k} = \pi_{3k+1} \Leftrightarrow \pi_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

Et dans le cas où $\pi_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$, $T^{3k+2} = \pi_0 T^2 = \pi_0 T \times T = \pi_0 T = \pi_0$, ce qui donne une suite constante, donc convergente.

Dans les autres cas, la suite est cyclique. Elle ne converge pas (elle oscille entre les valeurs π_0 , et T^2).

Donc la suite (π_n) converge si et seulement si $\pi_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

Remarque : si la suite est convergente, elle converge vers $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$